

阿司匹林肠溶片说明书



请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：阿司匹林肠溶片

英文名称：Aspirin Enteric-coated Tablets

汉语拼音：Asipilin Changrong Pian

[成份] 本品每片含阿司匹林 0.3 克，辅料为：淀粉、蔗糖、糊精、丙烯酸树脂 II 号、III 号、滑石粉、吐温-80、邻苯二甲酸二乙酯、乙醇。

[性状] 本品为肠溶包衣片，除去包衣后显白色。

[作用类别] 本品为解热镇痛类非处方药药品。

[适应症] 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[规格] 0.3 克

[用法用量] 口服。8~14 岁儿童，一次 1 片；14 岁以上儿童及成人，一次 1~2 片；若持续发热或疼痛，可间隔 4~6 小时重复用药 1 次，24 小时不超过 4 次。

[不良反应]

1. 较常见的有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等胃肠道反应。
2. 较少见或罕见的有（1）胃肠道出血或溃疡，表现为血性或柏油样便，胃部剧痛或呕吐血性或咖啡样物，多见于大剂量服药患者。（2）支气管痉挛性过敏反应，表现为呼吸困难或哮喘。（3）皮肤过敏反应，表现为皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等。（4）血尿、眩晕和肝脏损害。

[禁忌]

1. 孕妇、哺乳期妇女禁用。
2. 哮喘、鼻息肉综合征、对阿司匹林和其他解热镇痛药过敏者禁用。
3. 血友病或血小板减少症、溃疡病活动期患者禁用。

[注意事项]

1. 本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。
2. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
3. 必须整片吞服，不得碾碎或溶解后服用。
4. 年老体弱患者应在医师指导下使用。
5. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
6. 痛风、肾功能减退、心功能不全、鼻出血、月经过多以及有溶血性贫血史的患者慎用。
7. 发热伴脱水的患儿慎用。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 本品不宜与抗凝血药（如双香豆素、肝素）及溶栓药（链激酶）同用。
2. 抗酸药如碳酸氢钠等可增加本品自尿中的排泄，使血药浓度下降，不宜同用。
3. 本品与糖皮质激素（如地塞米松等）同用，可增加胃肠道不良反应。
4. 本品可加强口服降糖药及甲氨蝶呤的作用，不应同用。
5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品能抑制前列腺素合成，具有解热、镇痛作用。

[贮藏]密封，在干燥处保存。

[包装] 白色塑料瓶 100 片/瓶

[有效期] 12 个月

[执行标准] 《中国药典》2005 年版二部

[批准文号] 国药准字 H11020838

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：北京太洋药业有限公司

生产地址：北京市朝阳区双桥东路乙 1 号

邮政编码：100024

电话号码：010-85393719

传真号码：010-85390565

网 址：www.taiyangpharm.com

如有问题可与生产企业联系